

(중국어)

< 关于新型冠状病毒19 预防接种后说明 -1>

○ 接种当天

-健康状态良好时接种/ -彻底的预诊/ -安全的接种

○ 接种后

- 接种机构观察异常反应

○ 新型冠状病毒预防接种后注意事项

- * 接种后15~30分钟待在接种机构，观察是否出现异常反应
- 无特别过敏者，接种后观察15分钟
- 过去发生过过敏现象者，必须观察30分钟
- * 回家后至少要静养3小时以上，注意观察是否出现异常反应
- * 接种后至少3天内请多加关注是否出现特别症状
- * 接种当天和第二天请勿进行过激的运动及饮酒
- * 接种当天最好不要洗澡
- * 接种部位保持清洁
- * 老年人接种疫苗后，不要一个人待着，要和其他人在一起，以便出现症状时得到帮助

新型冠状病毒19预防接种相关的详细信息请在 [코로나19예방접종.kr](https://nip.kdca.go.kr) 网页确认！

< 关于新型冠状病毒19 预防接种后说明 -2>

○ 预防接种后出现异常反应

▶ 预防接种后常见症状

预防接种后，如下症状常见，这是免疫形成过程中可能出现的反应，大部分在2~3天内消失。

- 接种部位疼痛，浮肿，红肿 / - 发烧，恶心，肌肉痛 / - 疲劳感 / - 头痛

▶ 预防接种后，如果出现这种症状？

- 接种部位浮肿、疼痛的情况，请使用干净的毛巾在上面冷敷。
- 低烧时，请充分摄取水分并休息。
- 因全身疼痛或发热 感到不适舒服时，解热、镇痛剂可能会有所帮助。
- 接种前请提前准备解热·镇痛剂，出现症状请立即服用。虽然不限服用解热·镇痛剂，但请尽量服用没有消炎效果的乙酰氨基酚成分医药品。

▶ 新型冠状病毒接种后怀疑发生异常反应时

大部分服用解热·镇痛剂，症状会好转，但接种部位持续2天以上浮肿、疼痛、红肿 等时请接受医生的诊疗。

如果出现呼吸困难、意识消失、面部浮肿等严重的过敏反应（乙酰氨基酚等），请立即拨打119或到附近的急诊室求诊。

+ 预防接种后确认健康状态 <https://nip.kdca.go.kr>

+ 预防接种后申报异常反应 <https://nip.kdca.go.kr>

+ 通过预防接种助手网页 (<https://nip.kdca.go.kr>) 可以确认我的症状，并可得到相应的方法。